

Unità operativa U0065

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso
Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	CRV1	CERVERE franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Haplustalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
20.00	CRV2	CERVERE franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase ghiaiosa	Typic Haplustalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
45.00	MAD1	MADDALENA franco-fine, fase tipica	Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
5.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità è formata da 11 delineaioni poste nella pianura cuneese nord-orientale, a Nord e a Sud di Narzole (CN) e nei pressi di Roreto (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Porzioni di pianura terrazzata intermedia fra il livello dei terrazzi più alti (Montarosse, Salmour, Beinale, Marene) e la scarpata che porta all'attuale piana alluvionale del fiume Stura. Il substrato è caratterizzato da depositi ghiaiosi molto alterati di probabile pertinenza Stura con un'influenza del Tanaro in alcune situazioni. Si tratta di Alfisuoli che presentano un profilo caratterizzato da un colore Munsell variabile da 10YR negli orizzonti più superficiali, fino a 7.5YR nell'orizzonte Bt. Le ghiaie che nella maggior parte dei casi si mantengono ad una profondità prossima agli 80 cm, talora, soprattutto nelle zone più prossime alle scarpate, si trovano a profondità inferiori. Cerealicoltura e praticoltura sono gli usi del suolo prevalenti.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli della MADDALENA tipica presentano scheletro a profondità elevata e tessitura franca o franco-argillosa mentre quelli della CERVERE tipica presentano scheletro più in superficie e tessitura franca o franco-sabbiosa. Infine quelli della CERVERE ghiaiosa sono ghiaiosi anche nel topsoil.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Presenza di scheletro abbondante entro i 40 cm di profondità: CERVERE ghiaiosa 1 Assenza di scheletro entro i 40 cm di profondità: vai a 2 2 Presenza di scheletro abbondante entro gli 80 cm di profondità: CERVERE tipica 2 Assenza di scheletro entro gli 80 cm di profondità: MADDALENA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

I suoli CERVERE tipica e ghiaiosa sono maggiormente presenti al bordo della forma, in prossimità delle scarpate ed in particolare sono maggiormente diffusi nella delineaione posta più a nord nei pressi del centro abitato omonimo.

Unità cartografiche concorrenti

Unità	Nome
U0482	U0482 ha un pedoclima con caratteristiche più udiche.
U0499	U0499 caratterizzata da suoli maggiormente erosi, con una percentuale più elevata di scheletro e di pietrosità superficiale.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026

