

Unità operativa U0100

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	CHB1	CHIABERTI franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Haplustept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
60.00	MOT3	MOTTA franco-grossolana, fase decarbonatata	Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Questa unità è costituita da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese settentrionale, in destra Maira, da Racconigi (CN) fino poco oltre il confine tra le province di Torino e Cuneo, nel comune di Carmagnola (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di una pianura uniforme formata da depositi sabbiosi e limosi di pertinenza del Maira. L'uso del suolo è caratterizzato prevalentemente dalla maiscoltura intensiva.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli ivi presenti sono debolmente evoluti; quelli riconducibili alla fase CHIABERTI tipica hanno abbondante scheletro a partire dalla profondità di circa 80 cm e, prevalentemente, non sono calcarei; i suoli MOTTA decarbonatata presentano profondità utile più elevata, scheletro generalmente assente ed assenza di carbonato di calcio.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Presenza di abbondante scheletro da 80 cm di profondità, prevalente assenza di carbonato di calcio: CHIABERTI tipica

1 Assenza di abbondante scheletro, prevalente assenza di carbonato di calcio: MOTTA decarbonatata

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026