

Unità operativa U0103

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
80.00	SCR1	SCARNAFIGI franco-grossolana, fase tipica	Aquic Udifluent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
20.00	SRT1	SARTA franco-grossolana, fase tipica	Typic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da 2 delineazioni di cui una molto estesa, poste nella pianura cuneese centrale in destra idrografica del Varaita a nord di Villanova Solaro (CN) e, più estesamente, tra i fiumi Varaita e Po, da nord di Scarnafigi (CN) fino a sud di Polonghera (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Estesa porzione di pianura, originata da depositi sabbiosi e limosi del Varaita, caratterizzata da una morfologia a tratti leggermente depressa. L'uso del suolo è cerealicolo (maiscoltura) e prativo, quest'ultimo predominante dove sono più accentuate le condizioni di idromorfia.

Caratteri differenziali dei suoli

In superficie il suolo ha colore bruno o bruno oliva, reazione subacida o neutra, scheletro assente e tessitura franco sabbiosa. La Fase SCARNAFIGI tipica presenta caratteri di idromorfia a partire da circa 70 cm mentre nella Fase SARTA tipica i caratteri di idromorfia sono presenti già sotto la soletta di aratura e si manifestano con un colore del suolo prevalentemente grigio.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 caratteri di idromorfia presenti entro 50 cm di profondità: SARTA tipica
1 caratteri di idromorfia presenti oltre i 50 cm di profondità: SCARNAFIGI tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026