

Unità operativa U0114

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	FON1	FONTANETTE franco-grossolana, fase tipica	Aquic Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
60.00	VIN2	VINOVO franco-grossolana, fase idromorfa	Fluventic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Nove delineazioni formano questa Unità cartografica. Sono caratterizzate da una forma allungata in direzione ovest-est e sono poste nella pianura torinese meridionale, tra Nichelino (TO), None (TO), Piobesi Torinese (TO) e Vinivo (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura principale uniforme, caratterizzata da suoli che sono influenzati dalla presenza di una falda prossima alla superficie. La risalita capillare è causa di fenomeni di riduzione negli orizzonti sottosuperficiali ed in quelli profondi. L'uso del suolo è prevalentemente caratterizzato da cerealicoltura con mais, da praticoltura e da pioppicoltura.

Caratteri differenziali dei suoli

La Fase FONTANETTE tipica ha condizioni di idromorfia evidenti entro i 70 cm, la Fase VINOVO idromorfa oltre i 70 cm di profondità.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 evidente idromorfia entro 70 cm FONTANETTE tipica 1 evidente idromorfia oltre 70 cm VINOVO idromorfa

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato un modello ricorrente nella distribuzione.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026