

Unità operativa U0119

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	MOT3	MOTTA franco-grossolana, fase decarbonatata	Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
40.00	SLV1	SALVAJ franco-grossolana, fase tipica	Aquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da un'unica delineazione di forma stretta ed allungata in direzione sud - nord, posta nella pianura cuneese centrale, tra Savigliano (CN) e Monasterolo di Savigliano (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura principale ondulata dove è evidente la concomitante influenza dei fiumi Varaita e Maira nella sua genesi. Si alternano infatti depositi alluvionali calcarei a prevalente colore grigiastro (tipici del Maira) ad altri più bruni e completamente decarbonatati (tipici del Varaita). Si tratta di suoli con caratteri di idromorfia più o meno profonda. L'uso del suolo è in prevalenza cerealicolo con dominanza del mais.

Caratteri differenziali dei suoli

Suoli caratterizzati in superficie da colore bruno oliva, tessitura franco-sabbiosa o franco-limosa, scheletro da assente a scarso e reazione neutra o subalcalina. Il carbonato di calcio è irregolarmente presente. I suoli della fase SALVAJ tipica presentano un orizzonte scuro sepolto; quelli della fase MOTTA decarbonatata ne sono privi.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 presenza di un orizzonte scuro sepolto: SALVAJ tipica 1 assenza di un orizzonte scuro sepolto: MOTTA decarbonatata

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026