

Unità operativa U0124

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	SOL1	SOLERE franco-grossolana, fase tipica	Aquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
70.00	SOL2	SOLERE franco-grossolana, fase idromorfa	Aquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da un'unica delineazione di limitata estensione, posta nella pianura cuneese centro - occidentale, tra i corsi dei fiumi Varaita e Maira, all'altezza di Monsola (CN), a nord di Levaldigi (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura principale uniforme originatasi da depositi sabbiosi del Maira e caratterizzata da falde superficiali per la presenza di risorgive (tipiche delle aree che seguono i conoidi pedemontani). L'uso del suolo è soprattutto caratterizzato da mais e prato.

Caratteri differenziali dei suoli

In superficie il colore del suolo è bruno grigiastro scuro (Fase tipica) o molto scuro (Fase idromorfa), la tessitura franco sabbiosa o franco limosa, lo scheletro assente, la reazione subalcalina con presenza di carbonato di calcio. Nella Fase tipica i segni di idromorfia sono evidenti da circa 60 cm di profondità, nella Fase idromorfa sono visibili entro i 50 cm.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Idromorfia oltre 50 cm di profondità: SOLERE tipica 1 Idromorfia entro 50 cm di profondità: SOLERE idromorfa

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato un modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026