

Unità operativa U0125

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
20.00	BAL1	BALANGERE franco-grossolana, fase tipica	Aeric Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
50.00	SRT1	SARTA franco-grossolana, fase tipica	Typic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
20.00	STA1	STAFFARDA franca, fase tipica	Hydric Haplohemist, loamy, mixed, dysic, mesic	HISTOSUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da 4 delineazioni poste nella pianura cuneese centro - occidentale, in sinistra idrografica del Po; tre di queste, di cui due piuttosto estese, si trovano nei pressi di Staffarda (CN) ed una di forma allungata, disposta lungo il Rio Cantogno, è situata a nord di Cardè (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di aree che corrispondono alla superficie occupata da un'antica palude, caratterizzate da suoli fortemente idromorfi, per la presenza di falde superficiali. Sono zone leggermente depresse rispetto al livello della pianura principale. L'uso del suolo è prevalentemente a pioppeto, a prato o a fustaie di latifoglie, residui di bosco planiziale con abbondante presenza di Farnia.

Caratteri differenziali dei suoli

Si tratta di suoli tutti fortemente idromorfi poichè la falda è assai prossima alla superficie. I suoli della Fase SARTA tipica presentano colore grigiastro già al di sotto della soletta di aratura. Gli Histosuoli della Fase STAFFARDA tipica presentano un potente orizzonte superficiale con importante accumulo di sostanza organica mentre in quelli della Fase BALANGERE tipica si manifesta maggiormente, con la presenza di screziature, l'oscillazione della falda che determina un continuo alternarsi dei fenomeni di ossidazione e riduzione.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Suoli con potente orizzonte organico superficiale: STAFFARDA tipica 1 Suoli che non presentano un orizzonte organico superficiale: vai a 2 2 Suoli con numerose screziature giallo-aranciate: BALANGERE tipica 2 Suoli con poche screziature giallo-aranciate e predominanza di quelle grigie: SARTA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026