

Unità operativa U0133

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	MNS1	MONASTEROLO scheletrico-franca, fase tipica	Typic Haplustept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
40.00	MOT3	MOTTA franco-grossolana, fase decarbonatata	Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da un'unica delineazione posta nella pianura cuneese centro-settentrionale tra i corsi dei fiumi Maira e Varaita ad est di Murello (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di un'area leggermente sopraelevata rispetto al livello delle superfici circostanti costituita da depositi prevalentemente sabbiosi e ghiaiosi del Maira e del Varaita. L'uso del suolo prevalente è la praticoltura con presenza anche di mais.

Caratteri differenziali dei suoli

La MONASTEROLO tipica ha colore bruno e presenza di abbondante scheletro al di sotto dei 60 cm. di profondità. La MOTTA decarbonatata, ha colore dominante bruno oliva ed è priva di scheletro.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Presenza di abbondante scheletro entro 70 cm di profondità: MONASTEROLO tipica 1 Assenza di abbondante scheletro entro 70 cm di profondità: MOTTA decarbonatata

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026