

Unità operativa U0138

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	CSG1	CASALGRASSO franco-grossolana, fase tipica	Aquic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
60.00	CVL1	CAVALLOTTA franco-grossolana, fase tipica	Typic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da due delineazioni, allungate in direzione sud-est / nord-ovest da Murello (CN) a Polonghera (CN), poste nella pianura cuneese centro-settentrionale in destra idrografica del fiume Varaita.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura piuttosto uniforme sopraelevata rispetto alla zona di piena ordinaria del fiume Varaita. Si tratta di depositi prevalentemente sabbiosi accumulatisi in seguito ai fenomeni di esondazione strordinaria del fiume. Gli usi del suolo sono la praticoltura e, secondariamente, la coltura del mais.

Caratteri differenziali dei suoli

Si tratta di suoli poco evoluti che manifestano talora condizioni di idromorfia negli orizzonti più profondi per la presenza di una falda superficiale, connessa al deflusso ipodermico del vicino corso d'acqua.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Suolo con caratteri di idromorfia oltre 50 cm di profondità: CASALGRASSO tipica
1 Suolo con caratteri di idromorfia entro 50 cm di profondità: CAVALLOTTA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026