

Unità operativa U0148

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
65.00	AQS1	ACQUASANA franco-grossolana su scheletrico-franca, fase tipica	Aquic Haplustept, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
25.00	AQS3	ACQUASANA franco-grossolana su scheletrico-franca, fase ghiaiosa	Aquic Haplustept, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità è formata da un'unica estesa delineazione, situata nella pianura cuneese centrale ad ovest di Fossano (CN) in una fascia di pianura posta in direzione sud - nord, tra i paesi di Centallo (CN) e Genola (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura alluvionale di origine Grana-Stura formata da depositi che hanno ricoperto una vecchia superficie palustre i quali hanno successivamente subito processi di erosione fluviale più o meno intensi, che hanno portato il livello delle ghiaie più in prossimità della superficie. Copertura prevalente a seminativo con netta prevalenza della coltura del mais.

Caratteri differenziali dei suoli

La Fase tipica ha un livello delle ghiaie posto a circa 60 - 70 cm di profondità mentre la Fase ghiaiosa ha le ghiaie subito al di sotto della soletta di aratura ed a tratti anche in superficie.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 livello delle ghiaie al di sotto della soletta di aratura o più superficiale: ACQUASANA ghiaiosa
1 livello delle ghiaie oltre i 50 cm di profondità: ACQUASANA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

La Fase ghiaiosa pare essere maggiormente frequente nella parte meridionale dell'Unità e nella zona più prossima alla U146.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026