

Unità operativa U0169

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	RCH1	RICHIARDO limoso-fine, fase tipica	Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
40.00	MRO1	MAROCCHI sabbiosa, fase tipica	Psammentic Haplustalf, sandy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità costituita da un'unica estesa delineazione posta nella pianura cuneese nord orientale ed in quella torinese sud orientale, che ha come limite orientale le colline del Roero e come limite occidentale l'area un tempo percorsa dal Paleotanaro. Essa si estende da Bra (CN) fino ad oltre Carmagnola (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di una superficie in lieve declivio verso la piana del Paleotanaro costituita dall'affiorare dei depositi limosi pedogenizzati della collina, a tratti ricoperti da una coltre più o meno spessa di depositi sabbiosi di alluvium e di colluvium delle colline. I suoli ivi presenti sono evoluti. L'uso del suolo è principalmente caratterizzato dalla maiscoltura e, secondariamente, dalla praticoltura.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli MAROCCHI tipica presentano tessitura da franco sabbiosa a sabbiosa lungo tutto il profilo mentre quelli RICHIARDO tipica hanno una tessitura fine con elevate percentuali di argilla.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Tessitura del subsoil da franco sabbiosa a sabbiosa: MAROCCHI tipica 1 Tessitura del subsoil da franco limosa a argillosa: RICHIARDO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

La Serie MAROCCHI è maggiormente presente nelle zone più a ridosso dei versanti collinari.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026