

Unità operativa U0182

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
90.00	PLT1	PALEOTANARO limoso-grossolana, fase tipica	Fluvaquentic Endoaquept, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica presente in un'unica delinazione localizzata nella pianura cuneese nord orientale, tra Bra (CN) e Sanfré (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

La morfologia è quella del livello di pianura formata da depositi calcarei piuttosto fini (limi) depositi dal Paleotanaro, più precisamente nella sua porzione centrale caratterizzata da maggiore idromorfia. Il suolo ivi presente è debolmente calcareo, debolmente evoluto e presenta caratteri di idromorfia già dalla profondità di circa 40 cm. L'uso del suolo è caratterizzato dalla praticoltura e, secondariamente, dalla maiscoltura.

Caratteri differenziali dei suoli**Chiave di riconoscimento dei suoli****Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026