

Unità operativa U0183

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
80.00	BND1	BANDITO franco-grossolana, fase tipica	Oxyaquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità presente in un'unica delinazione localizzata nella pianura cuneese nord orientale, tra Bra (CN) e Sanfré (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

La morfologia è quella del livello di pianura formata da depositi piuttosto fini (limi e sabbie molto fini) deposti dal Paleotanaro, più precisamente nella sua porzione più prossima ai rilievi collinari. Il suolo ivi presente è debolmente calcareo, debolmente evoluto e presenta temporanei caratteri di idromorfia dalla profondità di circa 90 cm. L'uso del suolo è caratterizzato dalla praticoltura e, secondariamente, dalla maiscoltura intensiva.

Caratteri differenziali dei suoli**Chiave di riconoscimento dei suoli****Modello di distribuzione dei suoli**

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026