

Unità operativa U0184

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	SRT1	SARTA franco-grossolana, fase tipica	Typic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
40.00	BRE1	BREA limoso-fine, fase tipica	Typic Endoaquept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità presente in un'unica delinazione localizzata nella pianura cuneese nord orientale, tra Sanfré (CN) e Sommariva del Bosco (CN), all'interno dell'incisione del Paleotanaro.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

La morfologia è quella del livello di pianura formata dai depositi piuttosto fini (limi e sabbie molto fini) del Paleotanaro, più precisamente questa area corrisponde alla porzione nella quale la falda è più superficiale. Il suoli ivi presenti sono debolmente o non evoluti e presentano marcati caratteri di idromorfia già dalla profondità di circa 40 cm. L'uso del suolo è esclusivamente a pioppeto.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli SARTA tipica sono suoli giovani nei quali non vi è evidenza di sviluppo dei processi pedogenetici mentre i suoli BREA tipica presentano un maggiore sviluppo di tali processi e presentano tessiture più fini.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Assenza di un orizzonte cambico e tessitura franco-grossolana: SARTA tipica 1 Presenza di un orizzonte cambico e tessitura franco-fine: BREA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente nella distribuzione.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026