

Unità operativa U0186

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	MNG1	MANIGA scheletrico-franca, fase tipica	Aquic Haplustept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
40.00	MNG2	MANIGA scheletrico-franca, fase ghiaiosa superficiale	Aquic Haplustept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità costituita da un'unica delineazione posta su una limitata superficie della pianura cuneese settentrionale, in destra Maira, in corrispondenza del Bosco di Caramagna (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di un' area leggermente depressa rispetto al livello della pianura circostante formata da depositi estremamente ghiaiosi di probabile origine Grana e Stura. I suoli presentano un debole grado di evoluzione, scheletro abbondante al di sotto dei 50 cm di profondità e caratteri di idromorfia al di sotto di tale profondità. L'uso del suolo è esclusivamente a bosco.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli MANIGA ghiaiosa superficiale hanno una profondità utile ridotta a 30 cm per la presenza di abbondante scheletro, mentre i suoli MANIGA tipica presentano profondità utile leggermente superiori (circa 50 cm).

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Presenza di abbondante scheletro entro 40 cm di profondità: MANIGA scheletrico superficiale 1 Assenza di abbondante scheletro entro 40 cm di profondità: MANIGA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

La MANIGA scheletrico superficiale è maggiormente presente nella parte più interna della leggera depressione che costituisce il Bosco del Merlino (Bosco di Caramagna).

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026