

Unità operativa U0189

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	BMB1	BOMBONINA scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Dystric Fluventic Eutrudept, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	TAN1	TANARO scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Ustifluvent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità costituita da un'unica delineaazione posta in sinistra Stura, lungo il corso del fiume, sotto l'abitato di Bra (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Terzo livello di terrazzi dello Stura dove sono ancora presenti tracce di deviazioni del corso del fiume. Alluvioni sabbioso-ghiaiose medio-recenti con presenza di ciottoli anche in superficie. L'uso del suolo è costituito da praticoltura prevalente e da pioppicoltura.

Caratteri differenziali dei suoli

Si tratta di suoli che presentano abbondanti ghiaie anche in superficie. Essi si distinguono per un certo grado di evoluzione nella BOMBONINA tipica e nessuna nella TANARO tipica e per la reazione all'acido cloridrico (nella TANARO tipica) che invece è assente in tutti gli orizzonti nella BOMBONINA tipica.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Presenza di reazione all'acido cloridrico in tutti gli orizzonti: TANARO tipica 1 Assenza di reazione all'acido cloridrico in tutti gli orizzonti: BOMBONINA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026