

Unità operativa U0198

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	SRP1	STROPPIANA franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	MDC1	MOTTA DEI CONTI franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	FIS1	FISNENGO franco-grossolana, fase tipica	Typic Endoaquept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

5 delineazioni di forma stretta ed allungata compongono questa Unità cartografica che si posiziona sulla pianura vercellese meridionale. Le delineazioni più occidentali sono posizionate a nord-est di Trino, le altre due di maggiore estensione sono situate ad ovest di Motta de' Conti e Caresana; una delineazione di limitata estensione, la più settentrionale, è posta ad est di Prarolo.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Paesaggio tipicamente risicolo, con morfologia di pianura ondulata, ormai in gran parte livellata anche se è ancora riconoscibile una leggera depressione di queste superfici rispetto alla pianura principale circostante. Si tratta di aree nate dall'incisione di alcuni rii come il Marcova che solcano la pianura da ovest ad est. I depositi di partenza sono non uniformi ma relativamente grossolani: da sabbie fini a ghiaie di piccole dimensioni diametriche.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli presenti sono relativamente differenti tra loro. Suoli molto idromorfi e non ghiaiosi sono da associare a FISNENGO tipica, suoli ghiaiosi a MOTTA DE' CONTI tipica e suoli profondi con segni di idromorfia naturale solo in profondità sono associabili alla fase STROPPIANA tipica.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di ghiaie abbondanti entro 50-60 cm: MOTTA DE' CONTI tipica 1. Assenza di ghiaie o ghiaie presenti in percentuali esigue: vai a 2 2. Idromorfia presente lungo tutto il profilo: FISNENGO tipica 2. Idromorfia presente solo in profondità: STROPPIANA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Da approfondire la distribuzione dei suoli.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026