

Unità operativa U0200

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	DAR1	DAROLA limoso-fine, fase tipica	Fluventic Endoaquept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
60.00	SNG1	SANGUINOLENTO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

E' composta da una grande ed estesa delineaazione e da una limitrofa di minore dimensione. Si trovano entrambe a nord della Partecipanza fra gli abitati di Tricerro e Costanzana e comprendono le terre di pertinenza di due importanti corsi d'acqua: il rio Sanguinolento e il rio Lamporo (che prende poi nome di Marcova).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Terre tipiche delle aree idromorfe che contornano i percorsi dei rii a nord della Partecipanza di Trino, in particolare il Lamporo (che prende poi nome di Marcova) e il Sanguinolento. Sono caratterizzate da una minore parcellizzazione per camere da risaia e, per la presenza di deposizioni alluvionali recenti sabbiose, vengono coltivate anche a pioppo.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli DAROLA sono caratterizzati da un orizzonte B di alterazione per idromorfia molto elevata e da tessiture franco-limose, mentre i suoli SANGUINOLENTO sono terre più recenti, a tessitura franca o franco-sabbiosa, con idromorfia meno evidente nella prima parte del profilo.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Tessiture franco-limose e colore bruno olivastro: DAROLA tipica
1. Tessiture franco-sabbiose o franche e colore bruno grigiastro: SANGUINOLENTO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

I suoli SANGUINOLENTO tendono ad essere maggiormente presenti nelle zone limitrofe ai corsi d'acqua.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026