

Unità operativa U0206

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	RVL1	RIVELLINO limoso-fine, fase tipica	Typic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	PAV1	PAVESA limoso-fine, fase tipica	Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Questa unità cartografica è costituita da due delineazioni presenti rispettivamente a nord degli abitati di Piovera (AL) e di Lobbi (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di superfici pianeggianti delimitate da un'evidente scarpata sia verso le unità tipicamente alluvionali del fiume Tanaro sia verso il livello principale della pianura. L'uso del suolo è prevalentemente cerealicolo, ma l'alternanza con le coltivazioni di mais e barbabietole è frequente. I suoli di quest'unità si sviluppano su depositi alluvionali e spesso mostrano negli orizzonti profondi tracce di idromorfia per la presenza di una falda che deriva dalle unità della pianura principale di Scrivia.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli RIVELLINO presentano un topsoil di colore bruno oliva caratterizzato da tessitura franco-limosa. Il subsoil ha colore bruno oliva chiaro, tessitura franco-limosa. Più in profondità sono presenti orizzonti con colori variabili dal grigio brunastro al bruno giallastro chiaro in cui sono evidenti screziature redossimorfiche determinata dalla variazione dell'altezza di falda. Il calcare è sempre presente. Non si rileva invece la presenza di scheletro. I suoli PAVESA presentano un topsoil di colore bruno oliva caratterizzato da tessitura franco-limosa. Il subsoil ha tessitura franco-limosa, sono presenti orizzonti con colori variabili dal grigio brunastro al bruno giallastro chiaro in cui sono evidenti screziature di ossido-riduzione entro il metro.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di caratteri evidenti di idromorfia entro il primo metro: PAVESA tipica 1. Presenza di caratteri evidenti di idromorfia al di sotto del metro: RIVELLINO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026