

Unità operativa U0210

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	PBT4	POBBIETTO franco-grossolana, fase idromorfa	Aquic Ustifluent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
30.00	PBT1	POBBIETTO franco-grossolana, fase tipica	Aquic Ustifluent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità composta da due delineazioni fra Trino e Morano (VC).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

L'ambiente tipico è la piana alluvionale del Po, nelle sue parti non inondabili, poste immediatamente al di là dell'alveo straordinario del fiume e protette dall'argine. Sono zone ormai coltivate a riso in monocultura, anche se il pioppeto o il seminativo irrigui (mais) possono fornire ottime produzioni. Si tratta anche di aree interessate da antichi percorsi fluviali abbandonati e da deposizioni alluvionali debolmente pedogenizzate

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli POBBIETTO in fase idromorfa dominano sulla fase tipica e si distinguono per una più spiccata idromorfia

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Figure di ossido-riduzione più spiccate già dal topsoil: POBBIETTO idromorfa 1. Idromorfia al di sotto dei 60 cm: POBBIETTO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026