

Unità operativa U0217

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	RMZ1	RAMEZZANA limoso-fine, fase tipica	Aquic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
30.00	RMZ2	RAMEZZANA limoso-fine, fase poco profonda	Aquic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
20.00	MTR1	MONTARUCCO limoso-fine, fase tipica	Aeric Endoaqualf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità costituita da 7 delimitazioni di limitata estensione che sono poste a nord delle alluvioni del Po, tra Fontaneto Po e Trino Vercellese (VC).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Area di pianura ondulata che si situa ad un livello leggermente superiore rispetto all'attuale pianura principale. E' invece posto a d una quota decisamente superiore rispetto alle piane alluvionali del Po. Sono aree attualmente utilizzate per la coltura intensiva del riso e, per questo, hanno subito importanti modificazioni dovute all'azione dell'uomo che ha spianato i terreni per la costruzione delle camere di risaia.

Caratteri differenziali dei suoli

La Montarucco tipica ha evidenza di idromorfia entro i 40 cm di profondità mentre le fasi della Ramezzana sono evidentemente idromorfe oltre i 40-50 cm. La Ramezzana poco profonda presenta inoltre livelli ghiaiosi a circa un metro di profondità.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 idromorfia evidente entro i 50 cm di profondità: MONTARUCCO tipica 1 idromorfia evidente oltre i 50 cm di profondità: vai a 2 2 ghiaie presenti entro 100 cm di profondità: RAMEZZANA poco profonda 2 ghiaie presenti oltre 100 cm di profondità: RAMEZZANA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026