

Unità operativa U0221

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	RMZ2	RAMEZZANA limoso-fine, fase poco profonda	Aquic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
30.00	RMZ1	RAMEZZANA limoso-fine, fase tipica	Aquic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da cinque delimitazioni di limitata estensione che si posizionano una a sud del Parco delle Sorti della Partecipanza di Trino vercellese (VC) e le altre nei dintorni di Tricerro (VC).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Area di pianura ondulata che si situa ad un livello leggermente superiore rispetto all'attuale pianura principale. E' invece posto a d una quota decisamente superiore rispetto alle piane alluvionali del Po. Sono aree attualmente utilizzate per la coltura intensiva del riso e, per questo, hanno subito importanti modificazioni dovute all'azione dell'uomo che ha spianato i terreni per la costruzione delle camere di risaia.

Caratteri differenziali dei suoli

Le fasi della Ramezzana sono evidentemente idromorfe oltre i 40-50 cm. La Ramezzana poco profonda presenta livelli ghiaiosi a circa un metro di profondità ed orizzonti compatti verso la superficie.

Chiave di riconoscimento dei suoli

ghiaie presenti entro 100 cm di profondità: RAMEZZANA poco profonda ghiaie presenti oltre 100 cm di profondità: RAMEZZANA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

La Ramezzana poco profonda è presente soprattutto ai margini dell'Unità cartografica.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026