

Unità operativa U0233

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
65.00	MGR1	MARGHERIA franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustifluent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
30.00	MRN1	MORANO franco-grossolana, fase tipica	Oxyaquic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
5.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

14 delineazioni lungo l'asta fluviale del Po, in destra e sinistra del fiume

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

L'ambiente tipico è la piana alluvionale del Po, nelle sue parti non inondabili, poste immediatamente al di là dell'alveo straordinario del fiume e protette dall'argine. Sono zone coltivabili oltre che a pioppeto anche a seminativo, che, se irriguo, può fornire ottime produzioni. Si tratta anche di aree interessate da antichi percorsi fluviali abbandonati e da deposizioni alluvionali debolmente pedogenizzate dove domina la pioppicoltura, secondariamente mais e seminativi in genere.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli MARGHERIA sono caratterizzati da assenza o quasi di caratteri di idromorfia entro il primo metro, non presentano aspetti di alterazione pedogenetica, hanno tessitura franco-grossolana ma possono presentare orizzonti franco-limosi nel primo metro. I suoli MORANO presentano una maggiore idromorfia, sia pure poco marcata, rispetto ai suoli MARGHERIA, che induce probabilmente ad un grado evolutivo maggiore (accenno di Bw di struttura). La tessitura è franco-sabbiosa, o al più franca, in tutto il profilo.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Assenza di idromorfia: MARGHERIA tipica 1. Presenza di screziature grigio-olivastre fra 40 e 80 cm: MORANO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026