

Unità operativa U0234

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	BMB1	BOMBONINA scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Dystric Fluventic Eutrudept, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	CNT2	CENTALLO franco-grossolana, fase ghiaiosa	Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità costituita da un'unica delinazione posta nella piana del Tanaro nella porzione più prossima alla scarpata sotto all'abitato di Bra (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Depositi ghiaiosi e sabbiosi non calcarei di pertinenza dello Stura con abbondante presenza di ciottoli anche di grosse dimensioni .

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli BOMBONINA tipica presentano abbondanti ghiaie già al di sotto della soletta di aratura mentre quelli CENTALLO ghiaiosa sono leggermente più profondi.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Presenza di ghiaie subito al di sotto della soletta di aratura: BOMBONINA tipica 1 Assenza di ghiaie subito al di sotto della soletta di aratura: CENTALLO ghiaiosa

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026