

Unità operativa U0276

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	STN2	STANAVASSO franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase profonda	Typic Haplustept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	TSB1	TRISOBBIO franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da una sola delienazione posta nell'alveo del torrente Biasco, a sud di Novi Ligure (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Profonda incisione dei terrazzi che formano la pianura alessandrina meridionale che ospita il modesto torrente Biasco. Il suolo, originato dallo smantellamento dei sovrastanti terrazzi, presenta contatto con il substrato ghiaioso a profondità superiore al metro, permettendo una facile lavorabilità di queste superfici, che sono utilizzate per la coltivazione del grano o per la praticoltura.

Caratteri differenziali dei suoli

I due suoli presenti in questa unità cartografica si differenziano per il diverso grado evolutivo e la presenza di carbonato di calcio. I suoli Trisobbio, infatti, sono assai recenti e risentono dello smantellamento dei rilievi calcarei posti a sud di Novi Ligure, mentre i suoli Stanavasso sono più evoluti e risentono maggiormente dello smantellamento dei terrazzi antichi ad alfisui.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Effervescenza del suolo all'HCl: TRISOBBIO fase tipica. 1. Nessuna effervescenza del suolo all'HCl: STANAVASSO fase profonda

Modello di distribuzione dei suoli

I suoli TRISOBBIO sono maggiormente presenti nella parte iniziale dell'incisione descritta da questa unità cartografica.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026