

Unità operativa U0293

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	SNG1	SANGUINOLENTO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
60.00	SNG2	SANGUINOLENTO franco-grossolana, fase ghiaiosa	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

E' composta da 2 delineazioni . Si trovano entrambe a nord della Partecipanza fra gli abitati di Tricerro e Costanzana e comprendono le terre di pertinenza di due importanti corsi d'acqua: il rio Sanguinolento e il rio Lamporo (che prende poi nome di Marcova).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Terre tipiche delle aree idromorfe che contornano i percorsi dei rii a nord della Partecipanza di Trino, in particolare il Lamporo (che prende poi nome di Marcova) e il Sanguinolento. Sono caratterizzate da una minore parcellizzazione per camere da risaia e, per la presenza di deposizioni alluvionali recenti sabbiose, vengono coltivate anche a pioppo.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli SANGUINOLENTO sono terre più recenti, a tessitura franca o franco-sabbiosa, con idromorfia meno evidente nella prima parte del profilo. In queste delineazioni prevale la fase ghiaiosa con presenzza non elevata di scheletro lungo il profilo

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di ghiaie: SANGUINOLENTO ghiaiosa 1. Assenza di ghiaie: SANGUINOLENTO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Unità	Nome
U0200	

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026