

Unità operativa U0331

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	MOG1	MOGLIETTA franco-grossolana, fase tipica	Typic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
25.00	MOG2	MOGLIETTA franco-grossolana, fase decarbonatata	Typic Fluvaquent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
5.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità è costituita da numerose delineazioni in gran parte concentrate nel Canavese, all'interno dell'anfiteatro morenico d'Ivrea, tra Crotte-Carrone-Vische e Borgomasino. Un'unica isolata delineazione è stata descritta a Villardora (Bassa Valle di Susa).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Sono ambienti caratterizzati da aree alquanto depresse, di alvei abbandonati (paleomeandri), nelle vicinanze del fiume (Dora Baltea). Vegetazione spontanea e/o coltivata, igrofila (prevalentemente ontano), anche incolti; localmente mediocre pioppicoltura. I depositi fluviali che hanno solo in parte ricoperto questi meandri, risentono della presenza, ad una certa profondità, di una superficie (lacustre?), molto poco permeabile o, in concomitanza con fenomeni di piena, di una risalita di falda (vasi comunicanti) fino alla superficie del suolo.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli si differenziano principalmente per la presenza di Carbonato di Calcio nell'intero profilo oppure solo negli orizzonti profondi.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1: Presenza di Carbonato di Calcio nel topsoil: MOGLIETTA fase tipica; 1: Assenza di Carbonato di Calcio nel topsoil: MOGLIETTA fase decarbonatata.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato riconosciuto alcun modello di distribuzione dei suoli.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026