

Unità operativa U0436

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	ARE1	ARÈ franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Inceptic Hapludalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
40.00	LIV2	LIVORNO FERRARIS franco-grossolana, fase poco profonda	Inceptic Hapludalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

7 delineazioni di limitata estensione territoriale compongono la presente Unità cartografica. Sono dislocate all'interno della morena di Ivrea e in porzioni di scaricatori glaciali all'interno dei cordoni morenici, ad ovest di Strambino (TO) e, nel Vercellese, tra Crescentino e Livorno Ferraris.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Le delineazioni esterne alla morena rappresentano superfici pianeggianti, abbastanza uniformi, sulle quali è presente un utilizzo quasi esclusivamente agrario. Le delineazioni interne all'anfiteatro morenico di Ivrea sono invece da ricondurre alla antica dinamica glaciale: le morfologie sono tipicamente ondulate e l'uso è rappresentato da colture agrarie in rotazione.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli riferibili alla ARE' tipica sono caratterizzati dalla presenza abbondante, già nel subsoil, di ghiaie anche di dimensioni rilevanti. La LIVORNO FERRARIS poco profonda, invece, mostra questi orizzonti molto ricchi di scheletro a profondità mediamente maggiori.

Chiave di riconoscimento dei suoli

Orizzonti con presenza di ghiaia maggiore del 35% entro 60 cm di profondità: ARE' tipica
Orizzonti con presenza di ghiaia maggiore del 35% oltre 60 cm di profondità: LIVORNO FERRARIS tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026