

Unità operativa U0461

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	BLG1	BLANGETTI scheletrico-franca, fase tipica	Dystric Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
40.00	BLG4	BLANGETTI scheletrico-franca, fase profonda	Dystric Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	CRA1	CRAVA franco-grossolana, fase tipica	Fluvaquentic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica localizzata fra i comuni di Magliano Alpi e Carrù, in provincia di Cuneo. l'unità è costituita da due delineazioni localizzate a sud dell'abitato di Magliano Alpi.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Terrazzo medio-recente in sinistra Pesio, a superficie ondulata, sospeso di circa 50 m sul suo letto attuale. I filari di alberi che spesso contornano i campi ricordano l'ambito fluviale di cui quest'unità è margine. L'uso del suolo è agricolo con una dominanza della praticoltura in rotazione.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli BLANGETTI sono Inceptisuoli ricchi di ghiaie che nella fase profonda si trovano oltre i 50 cm di profondità. CRAVA tipica è invece caratterizzata da presenza di idromorfia negli orizzonti profondi e da assenza o presenza ridotta di ghiaie.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Caratteri di idromorfia presenti almeno negli orizzonti profondi: CRAVA tipica 1 Caratteri di idromorfia assenti: vai a 2
2 Ghiaie molto abbondanti entro 50 cm di profondità: BLANGETTI tipica 2 Ghiaie molto abbondanti oltre 50 cm di profondità: BLANGETTI profonda

Modello di distribuzione dei suoli

Spesso la CRAVA tipica si situa nelle aree dove sono più prossimi alla superficie i sedimenti pliocenici.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026