

Unità operativa U0466

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	PES1	PESIO scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Udifluent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
60.00	PES3	PESIO scheletrico-sabbiosa, fase di alveo	Typic Udifluent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Dallo sbocco delle valli Pesio e Brobbio in pianura, fino all'abitato di Morozzo (CN) ed in valle Ellero. L'unità cartografica si compone di 24 delineazioni, la maggior parte delle quali si localizza da Chiusa Pesio (CN) e Margarita (CN) sino a Rocca de' Baldi (CN); la restante parte è invece localizzata tra Roccaforte Mondovì (CN) e Villanova Mondovì (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Aste fluviali del Pesio, Brobbio ed Ellero e loro depositi ghiaioso-sabbiosi. La vegetazione è caratterizzata dal tipico arbusteto di ripa. La pioppicoltura è l'unico utilizzo agrario presente di una certa rilevanza in quanto l'eccesso di scheletro è fortemente limitante.

Caratteri differenziali dei suoli

Suoli ricchi di scheletro che si differenziano per la profondità alla quale è presente il letto delle ghiaie: oltre i 30 cm nella fase tipica, già nell'orizzonte superficiale nella fase di alveo.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Ghiaie abbondanti in superficie: PESIO di alveo 1 Ghiaie assenti o poco frequenti in superficie: PESIO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Unità	Nome
U0649	
U0638	

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026