

Unità operativa U0480

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	BLG1	BLANGETTI scheletrico-franca, fase tipica	Dystric Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	BLG4	BLANGETTI scheletrico-franca, fase profonda	Dystric Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	SCP1	SCOPPINO franco-grossolana, fase tipica	Aquic Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da un'unica delienazione che si colloca fra Margarita (CN) e Morozzo (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Superficie poco ondulata caratterizzata da deposizioni sabbioso-ghiaiose medio-recenti di Pesio-Brobbio. Terre brune caratterizzate da una ghiaiosità superficiale piuttosto diffusa, anche se in alcune zone (Casc. Cantatore) sono presenti suoli con profondità utile superiori alla media (40 cm) e con un maggior grado di sviluppo pedogenetico. Le tessiture sono franco-sabbiose e le reazioni neutre o subacide. Localmente sono presenti, in condizioni di leggera idromorfia e di coltivazione del prato, orizzonti superficiali scuri.

Caratteri differenziali dei suoli

Suoli ghiaiosi che si differenziano per la presenza di caratteri di idromorfia (SCOPPINO tipica) o per la profondità alla quale sono presenti le ghiaie: oltre i 40-50 cm nella BLANGETTI profonda, già nello strato di aratura nella BLANGETTI tipica.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Presenza di condizioni di idromorfia: SCOPPINO tipica 1 Assenza di condizioni di idromorfia: vai a 2 2 Ghiaie oltre i 45 cm: BLANGETTI profonda 2 Ghiaie entro i 45 cm: BLANGETTI tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026