

Unità operativa U0495

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
80.00	ARD1	ARMONDA franco-grossolana, fase tipica	Typic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	PCR1	PALEOCERVO limoso-fine, fase tipica	Aquic Glossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità costituita da 2 delineazioni poste nella pianura biellese occidentale in destra idrografica del fiume Cervo che si estendono dall'altezza di Benna (BI) fino a Villanova Biellese (BI).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Morfologicamente queste aree si trovano all'interno dell'incisione del Paleocervo ed identificano i colluvi provenienti dalle scarpate dei terrazzi delle Baraggie di Benna e di Ronco di Bo, poste immediatamente a est. Esse si presentano come piccoli conoidi debolmente degradanti verso il Paleocervo. I depositi sono costituiti da sabbie e limi non calcarei colluviati dalle scarpate. Il suolo presenta una debole evoluzione pedogenetica. L'uso del suolo è costituito quasi esclusivamente da prati irrigui.

Caratteri differenziali dei suoli

PALEOCERVO si differenzia dai suoli ARMONDA per la evidente presenza di un orizzonte di accumulo di argilla (argillico).

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 presenza dell'orizzonte argillico (suoli di origine alluvionale): PALEOCERVO tipica 1 assenza dell'orizzonte argillico (suoli di origine colluviale): ARMONDA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

PALEOCERVO è maggiormente presente nella parte meridionale delle delineazioni.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026