

Unità operativa U0499

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	CRV1	CERVERE franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Haplustalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
50.00	CRV2	CERVERE franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase ghiaiosa	Typic Haplustalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Piccole porzioni di pianura poste in sinistra e destra Tanaro, tra Mondovì (CN) e Clavesana (CN). L'unità cartografica si compone di 16 delineazioni.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Terrazzi alluvionali di estensione variabile, caratterizzati da terre di cui risalta il colore bruno rossastro caratteristico, dovuto all'orizzonte argillico ridotto in potenza e poggiante sulle ghiaie, talvolta affioranti. L'uso del suolo è totalmente agrario con una prevalenza di cerealicoltura e praticoltura. Suoli a reazione neutra nel subsoil e subacida nel topsoil, tessiture franche, drenaggio buono o moderatamente rapido. Profondità ridotte per la presenza di ghiaie anche superficiali.

Caratteri differenziali dei suoli

La fase CERVERE ghiaiosa si differenzia dalla CERVERE tipica per l'abbondanza di ghiaie già nei pressi della superficie del suolo.

Chiave di riconoscimento dei suoli

Scheletro assente o scarso negli orizzonti superficiali: CERVERE tipica Scheletro comune o abbondante negli orizzonti superficiali: CERVERE ghiaiosa

Modello di distribuzione dei suoli

La fase ghiaiosa è soprattutto presente nei pressi dei bordi dei terrazzi.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Alto

Data di aggiornamento

04.03.2026