

# Unità operativa U0505

## Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

| Percentuale | Fase | Nome                                       | Classificazione                                              | Ordine       |
|-------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 15.00       | CNL2 | CARNEVALE franco-grossolana, fase sabbiosa | Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic    | ENTISUOLI    |
| 15.00       | TAN1 | TANARO scheletrico-sabbiosa, fase tipica   | Typic Ustifluvent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic  | ENTISUOLI    |
| 35.00       | TAN2 | TANARO scheletrico-sabbiosa, fase profonda | Typic Ustifluvent, sandy-skeletal, mixed, calcareous, mesic  | ENTISUOLI    |
| 25.00       | QGL1 | QUAGLIA limoso-grossolana, fase tipica     | Fluventic Haplustept, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic | INCEPTISUOLI |
| 10.00       | XXX0 | Altri suoli                                |                                                              |              |

## Localizzazione geografica dell'Unità

L'unità si compone di un'unica estesa delineazione che si localizza lungo i corsi dei fiumi Tanaro e Corsaglia, da Ceva (CN) fino a Cherasco (CN).

## Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Alveo alluvionale fortemente influenzato dall'alluvione del novembre 1994. L'uso del suolo, per la maggior parte agricolo fino all'alluvione, è ora formato da numerosi incolti. Suoli a tessitura grossolana, generalmente calcarei, a reazione neutra o subalcalina, con una notevole percentuale di ghiaia a limitata profondità.

## Caratteri differenziali dei suoli

CARNEVALE sabbiosa non ha ghiaie entro un metro di profondità. TANARO tipica e profonda si differenziano per la profondità alla quale sono poste le ghiaie. QUAGLIA tipica mostra qualche segno di pedogenesi lungo il profilo.

## Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un orizzonte di alterazione di colore o formazione di struttura (Bw): QUAGLIA tipica 1. Assenza di un orizzonte di alterazione di colore o formazione di struttura (Bw): vai a 2 2. Depositi non ghiaiosi nei primi 100 cm: CARNEVALE sabbiosa 2. Depositi ghiaiosi nei primi 100 cm: vai a 3 3. Ghiaie abbondanti oltre 50 cm di profondità: TANARO profonda 3. Ghiaie abbondanti entro 50 cm di profondità: TANARO tipica

## Modello di distribuzione dei suoli

La TANARO tipica è abbondante nei pressi dell'attuale corso del fiume.

## Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

## Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

## Data di aggiornamento

04.03.2026