

Unità operativa U0517

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	GML1	GAMINELLA franco grossolana, fase tipica	Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	QTT1	QUATTORDIO limoso-fine, fase tipica	Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica che rappresenta i fondivalle del torrente Gaminella e del Rio della Valle, localizzati nel territorio comunale di Quattordio (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Sia tratta di ampi fondivalle presenti alla base dei terrazzi antichi che sfociano verso la pianura del fiume Tanaro. I depositi che formano tali superfici sono in parte colluviali e rappresentati da sedimenti di erosione dei terrazzi ed in parte di origine alluvionale. L'uso del suolo è costituito in prevalenza da praticoltura con alternanze di coltivi a cereali autunno vernini, mais e pioppeti.

Caratteri differenziali dei suoli

Nella fase GAMINELLA tipica il topsoil presenta colore bruno, il subsoil ha colore bruno giallastro. La tessitura è generalmente franca. Nella fase QUATTORDIO il topsoil presenta colore bruno oliva, il subsoil ha colore bruno oliva chiaro. La tessitura è generalmente franco limosa.

Chiave di riconoscimento dei suoli

Limo totale >50% nei primi 80 cm: QUATTORDIO tipica Limo totale <50% nei primi 80 cm: GAMINELLA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

I suoli GAMINELLA sono maggiormente localizzati in prossimità dei terrazzi.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026