

Unità operativa U0535

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	CNO1	CUNEO scheletrico-franca, fase tipica	Inceptic Hapludalf, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
15.00	CNO2	CUNEO scheletrico-franca, fase antropica	Inceptic Hapludalf, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
30.00	CNO4	CUNEO scheletrico-franca, fase acida	Inceptic Hapludalf, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
15.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Pianura in destra e sinistra Stura, a nord ed ad est della città di Cuneo.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Parte mediana del conoide pedemontano dello Stura e del Gesso, costituita da alluvioni antiche pedogenizzate fino al livello di Alfisuoli, successivamente erose, con ghiaie di dimensioni e quantità minori rispetto alla limitrofa unità U523, tali da ridurre notevolmente le pratiche di spietramento. Diffuse le coltivazioni del mais e del fagiolo. La frutticoltura è stata recentemente sviluppata nei dintorni di Cuneo.

Caratteri differenziali dei suoli

Suoli bruno rossastri nell'orizzonte sottosuperficiale e fortemente ghiaiosi. La fase antropica è evidenziata da diffuse pratiche di spietramento che hanno in parte ridotto la pietrosità nell'orizzonte superficiale; sono spesso evidenti in questo caso, ai bordi delle strade e dei campi, mucchi di pietre. La fase acida ha un pH mediamente inferiore a 5,5.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 pH mediamente inferiore a 5,5: CUNEO acida 1 pH mediamente superiore a 5,5: vai a 2 2 evidenti pratiche di spietramento: CUNEO antropica 2 suoli non spietrati: CUNEO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

La fase antropica è più diffusa verso il limite con l'unità U0523, mentre le fasi acida e tipica sono presenti più a nord.

Unità cartografiche concorrenti

Unità	Nome
U0536	
U0539	

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026