

Unità operativa U0538

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	CER1	CERIOLO scheletrico-franca, fase tipica	Ruptic-Alfic Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
40.00	CER2	CERIOLO scheletrico-franca, fase ghiaiosa	Ruptic-Alfic Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità costituita da undici delimitazioni localizzate in destra e sinistra Stura, da Cuneo fino a Fossano.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Quarto livello dei terrazzi dello Stura. Si tratta di alluvioni antiche pedogenizzate fino a livello di Alfisuolo e successivamente fortemente erose. Cerealicoltura e frutticoltura marginale con aree coltivate a fagiolo. Suoli superficiali, colore Munsell del topsoil variabile dal 10YR al 7,5YR, quello del subsoil sempre 7.5YR. Sono suoli spesso ghiaiosi anche in superficie, le tessiture sono prevalentemente franco-sabbiose, la reazione è neutra o subalcalina.

Caratteri differenziali dei suoli

Suoli ghiaiosi che si differenziano per la profondità alla quale sono poste le ghiaie. La fase tipica è fortemente ghiaiosa subito sotto la soletta di aratura, la fase ghiaiosa ha ghiaie abbondanti già in superficie.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Ghiaie abbondanti in superficie: CERIOLO ghiaiosa 1 Ghiaie assenti o poco frequenti in superficie: CERIOLO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Prevalgono i suoli riferibili alla fase ghiaiosa in sinistra Stura e i suoli della fase tipica in destra.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026