

Unità operativa U0581

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	SPE1	SPEALE franco-grossolana, fase tipica	Ruptic-Alfic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	SPE2	SPEALE franco-grossolana, fase sepolta	Ruptic-Alfic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da una sola delineazione posta nel Pinerolese (TO) tra Pinerolo e Scalenghe (TO), di contorno alla parte meridionale del piccolo terrazzo di Appendini che rappresenta l'ultimo residuo di un antico conoide del Chisone.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Parte del conoide recente del Chisone. Poco più a nord rispetto a questa Unità è evidente una porzione della vecchia superficie della pianura, successivamente smantellata dal Chisone che ha in seguito rideposto i materiali da qui questi suoli prendono origine. Tra i suoli del conoide recente del Chisone, quelli posti all'interno di questa Unità sono da porre tra i più evoluti.

Caratteri differenziali dei suoli

La Fase sepolta presenta in superficie un orizzonte di colore grigio scuro derivante dai depositi delle acque di irrigazione del Consorzio Moirano-Lemina, ricche di grafitoscisti, provenienti dal Chisone e dal Lemina. La Fase tipica ha invece colore bruno o bruno giallastro e non presenta una netta discontinuità cromatica tra il topsoil ed il subsoil.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Orizzonte superficiale grigio scuro in netto contrasto coi sottostanti SPEALE sepolta 1 Orizzonte superficiale bruno o bruno giallastro SPEALE tipica

Modello di distribuzione dei suoli

La Fase sepolta è presente sugli appezzamenti da più tempo irrigati a scorrimento con le acque del Consorzio Moirano-Lemina.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026