

Unità operativa U0586

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	FON1	FONTANETTE franco-grossolana, fase tipica	Aquic Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
60.00	QUI1	QUINTANELLO franco-grossolana, fase tipica	Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da 8 delineazioni raggruppate in tre fasce di estensione abbastanza simile, disposte da ovest ad est, dall'altezza degli abitati di Scalenghe (TO), Cercenasco (TO) e Vigone (TO), fino al paese di Virle Piemonte (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura principale del Pinerolese orientale, nella parte meridionale della provincia di Torino. Si tratta di zone dove l'influenza dell'acqua di falda è meno accentuata rispetto ai territori più settentrionali ancora oggi caratterizzati da un forte eccesso idrico. L'uso del suolo è per la maggior parte agrario con una netta prevalenza della cerealicoltura con mais.

Caratteri differenziali dei suoli

I due suoli hanno un grado evolutivo del tutto assimilabile; la maggiore differenza è rappresentata dalla presenza o meno nel profilo di condizioni di idromorfia. La QUINTANELLO tipica può avere segni di idromorfia ma al di sotto dei 70 cm di profondità; la FONTANETTE tipica presenta condizioni di drenaggio non ottimale già a circa 50 cm.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 forte idromorfia entro i primi 70 cm FONTANETTE tipica 1 forte idromorfia oltre i primi 70 cm QUINTANELLO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

La FONTANETTE tipica è maggiormente presente nei piccoli avvallamenti, la QUINTANELLO tipica sui piccoli dossi.

Unità cartografiche concorrenti

Unità	Nome
U0614	

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026