

Unità operativa U0588

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
20.00	STE1	STELLA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
70.00	STE2	STELLA franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase ghiaiosa	Dystric Eutrudept, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da due delineazioni adiacenti che sono situate nella pianura pinerolese, nella parte meridionale della provincia di Torino. In particolare tra Macello (TO) e Vigone (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Parte del conoide del Chisone formato da depositi fortemente ghiaiosi. Questa Unità rappresenta una porzione del conoide solo in parte risparmiata dall'erosione, sono terre infatti anche ricche di ghiaie, utilizzate comunque ampiamente dall'agricoltura con discreti risultati produttivi. L'uso del suolo dominante è rappresentato dalla cerealicoltura con mais in rotazione spesso con colture foraggiere.

Caratteri differenziali dei suoli

La differenza tra le due Fasi risiede essenzialmente nella quantità e nella profondità delle ghiaie. La Fase ghiaiosa presenta un livello di ghiaie entro i 60 cm di profondità ed è ghiaiosa spesso anche nell'orizzonte superficiale. La Fase tipica ha il livello dalle ghiaie inalterate oltre i 60 cm ed ha un orizzonte superficiale non ghiaioso o comunque con una scarsa presenza di scheletro.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 livello fortemente ghiaioso entro 60 cm STELLA ghiaiosa 1 livello fortemente ghiaioso oltre 60 cm STELLA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato verificato un modello ricorrente nella distribuzione dei suoli.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026