

Unità operativa U0589

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	GRD1	GRINDOLATO limoso-fine, fase tipica	Typic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	QTT1	QUATTORDIO limoso-fine, fase tipica	Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità localizzata in destra e sinistra idrografica del fiume Tanaro nei territori comunali di Cerro Tanaro (AL), Rocchetta Tanaro (AT) e Quattordio (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Sono superfici interessate dalle alluvioni straordinarie del fiume Tanaro ed essendo localizzate in prossimità della pianura principale e di terrazzi antichi presentano anche depositi colluviali, provenienti dall'erosione di quest'ultime. Sono aree leggermente pendenti verso la pianura alluvionale del fiume Tanaro. L'uso del suolo è agrario.

Caratteri differenziali dei suoli

Nella fase GRINDOLATO tipica il topsoil è caratterizzato da colore bruno olivastro ed il subsoil è caratterizzato da colore bruno olivastro chiaro. Le tessiture in entrambe è franco-limosa. Il calcare è presente. Nella fase QUATTORDIO tipica il topsoil presenta colore bruno oliva e tessitura franco limosa, il subsoil ha colore bruno oliva chiaro ed anch'esso tessitura franco limosa. Non si rileva la presenza di calcare.

Chiave di riconoscimento dei suoli

Calcare presente: GRINDOLATO tipica Calcare assente: QUATTORDIO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

I suoli QUATTORDIO sono presenti nelle aree più prossime alla pianura ed ai terrazzi.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026