

Unità operativa U0593

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	TRP1	TREPELLICE franco-grossolana, fase tipica	Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
70.00	TRP2	TREPELLICE franco-grossolana, fase sabbiosa	Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da un'unica estesa delineazione di forma allungata in direzione ovest-est, posta in sinistra del Chisone e, dopo la confluenza con il Pellice, in sinistra di quest'ultimo, nel torinese meridionale. In particolare l'Unità è posta tra la città di Pinerolo (TO) e Vigone (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Porzione di conoide del Chisone reincipa dal fiume che ha in parte asportato materiali ed in parte rideposto sedimenti in maggioranza formati da sabbie fini. I suoli sono abbastanza recenti e sono prevalentemente utilizzati per la coltura del mais.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli TREPELLICE sabbiosa hanno percentuali di sabbia totale mediamente sempre superiori al 50 % mentre i suoli TREPELLICE tipica possono avere percentuali anche minori con una maggiore presenza di limo. Inoltre nella Fase sabbiosa la sabbia è in costante crescita all'aumentare della profondità, al limite è costante nei primi due orizzonti; diminuisce per poi aumentare nella Fase tipica.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 sabbia tot. nel primo orizzonte >52%, sabbia in crescita nel profilo TREPELLICE sabbiosa 1 sabbia tot. nel primo orizzonte (52%, sabbia in calo poi in crescita TREPELLICE tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato un modello ricorrente nella distribuzione.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026