

Unità operativa U0637

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	BMB1	BOMBONINA scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Dystric Fluventic Eutrudept, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	BMB3	BOMBONINA scheletrico-sabbiosa, fase profonda	Dystric Fluventic Eutrudept, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Areali situati allo sbocco delle valli Pesio, Josina ed Ellero, lungo il corso dei torrenti, a nord di Chiusa Pesio (CN), tra Chiusa Pesio e Peveragno (CN) ed a nord di Roccaforte Mondovì (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura alluvionale fortemente ondulata, in parte posta all'interno delle valli ed in parte al loro sbocco, non più inondabile ma influenzata, in ere recenti, dai corsi d'acqua (Pesio, Josina ed Ellero). L'uso del suolo è caratterizzato da agricoltura residuale ed arboricoltura. Le colture più frequenti sono il prato, il grano ed il mais.

Caratteri differenziali dei suoli

La differenza fra le due tipologie tipologiche risiede nella profondità delle ghiaie.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 presenza ghiaie entro 60 cm: BOMBONINA tipica 1 presenza di ghiaie oltre 60 cm: BOMBONINA profonda.

Modello di distribuzione dei suoli

La fase profonda è prevalentemente posta in destra Josina, dove è evidente, a tratti, l'influenza del terrazzo antico sovrastante ed in valle Ellero dove vi è, in parte, l'influenza dei depositi marnosi posti in destra del fiume.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026