

Unità operativa U0639

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	BLG1	BLANGETTI scheletrico-franca, fase tipica	Dystric Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
60.00	CER1	CERIOLO scheletrico-franca, fase tipica	Ruptic-Alfic Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Conoide pseudopianeggiante, compreso tra i terrazzi antichi di Beinette (CN) e di Pianfei (CN), ad ovest di quest'ultimo. L'unità cartografica si compone di due delineazioni.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Conoide formato dai depositi ghiaioso-grossolani del torrente Pesio. L'uso del suolo è caratterizzato da praticoltura e cerealicoltura con grano, orzo, mais e rari pioppeti. Suoli bruni o bruno rossastri, con presenza di percentuali di ghiaia molto alte a profondità variabili da 30 a 60 cm, localmente anche in superficie. Le tessiture sono franco-sabbiose o sabbioso-franche e la reazione è subacida.

Caratteri differenziali dei suoli

BLANGETTI tipica è un Inceptisuolo ghiaioso che non mostra alcun segno di illuviazione di argilla; CERIOLO tipica è un Inceptisuolo altrettanto ghiaioso che ha però un inizio di illuviazione di argilla e colori bruno-rossastri.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 Colore Munsell del subsoil 7,5YR o più rosso: CERIOLO tipica 1 Colore Munsell del subsoil 10YR o più giallo: BLANGETTI tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è evidente un modello particolare di distribuzione. Suoli con colori leggermente più bruno-rossastri sono presenti nei pressi delle scarpate dei terrazzi, in conseguenza dell'apporto di materiali più pedogenizzati.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026