

Unità operativa U0675

Tipo e scala dell'Unità cartografica

○

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
80.00	FON1	FONTANETTE franco-grossolana, fase tipica	Aquic Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	QUI1	QUINTANELLO franco-grossolana, fase tipica	Dystric Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità cartografica è formata da 4 delineazioni, tre di area limitata ed una decisamente più estesa. Sono poste nella pianura torinese meridionale, non lontano dal confine con la provincia di Cuneo, in sinistra idrografica del Po, tra i paesi di Virle Piemonte (TO) ed Osasio (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura uniforme o leggermente ondulata formata dai depositi sabbiosi e limosi del Pellice/Chisone e del Po. Si tratta di zone dove l'influenza dell'acqua di falda è meno accentuata rispetto ai territori più settentrionali ancora oggi caratterizzati da un forte eccesso idrico. L'uso del suolo è per la maggior parte agrario con una netta prevalenza della cerealicoltura con mais.

Caratteri differenziali dei suoli

I due suoli hanno un grado evolutivo del tutto assimilabile; la maggiore differenza è rappresentata dalla presenza o meno nel profilo di condizioni di idromorfia. La QUINTANELLO tipica può avere segni di idromorfia ma al di sotto dei 70 cm di profondità, la FONTANETTE tipica presenta condizioni di drenaggio non ottimale già a circa 50 cm.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 forte idromorfia entro i primi 70 cm FONTANETTE tipica 1 forte idromorfia oltre i primi 70 cm QUINTANELLO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

I suoli FONTANETTE tipici sono maggiormente presenti nelle tre delineazioni di limitata estensione e nella parte settentrionale della delineazione più grande.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026