

Unità operativa U0836

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	POI1	POIRINO limoso-fine, fase tipica	Oxyaquic Haplustept, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
60.00	BUA1	BUTTIGLIERA D'ASTI limoso-fine, fase tipica	Typic Haplustalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da quattro delineazioni fra i comuni di Buttigliera d'Asti, Villanova d'Asti, S.Paolo Solbrito e Dusino S. Michele, in provincia d'Asti.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Superfici poco o affatto pendenti che costituiscono la parte più elevata dell'altopiano di Poirino, nei pressi della scarpata orientale. Si tratta della porzione meno erosa dei terrazzi, nei cui suoli ancora si riconoscono i segni delle antiche superfici.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli presenti nell'unità si differenziano per il diverso Ordine tassonomico nel quale si collocano. questo determina differenze per colore e tessitura: i suoli BUA1 appaiono generalmente più rossastri e a tessitura più argillosa nel subsoil.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Colore Hue Munsell a 50 cm pari a 7.5YR o più rosso: BUTTIGLIERA fase tipica. 1. Colore Hue Munsell a 50 cm pari a 10YR o più grigio: POIRINO fase tipica

Modello di distribuzione dei suoli

I suoli BUTTIGLIERA sono maggiormente presenti nelle delineazioni settentrionali e orientali.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026