

Unità operativa U0890

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
30.00	GRD1	GRINDOLATO limoso-fine, fase tipica	Typic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
60.00	LIS1	LISCARO limoso-fine, fase tipica	Typic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da un'unica delineazione presente nel territorio comunale di Oviglio (AL) nei pressi del fiume Tanaro.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di un terrazzo alluvionale piuttosto recente interessato solo marginalmente dalle alluvioni straordinarie del fiume Tanaro. E' una superficie che raccorda la pianura antica di Oviglio con la pianura alluvionale del fiume ed è formata da depositi alluvionali di Tanaro e da materiali colluviali provenienti dalla pianura. L'uso del suolo è agrario con coltivazioni di mais, cereali autunno vernini e barbabietola da zucchero.

Caratteri differenziali dei suoli

Nei suoli LISCARO tipica il topsoil è caratterizzato da un colore bruno e da una tessitura franco limosa; il subsoil presenta colore bruno giallastro e tessitura franco limosa. Lo scheletro è assente lungo tutto il profilo. Si tratta di suoli calcarei in tutti gli orizzonti. Nei suoli GRINDOLATO tipica il topsoil caratterizzato da colore bruno olivastro. Il subsoil ha colore bruno olivastro chiaro, tessitura franco limosa e struttura massiva. Lo scheletro è assente lungo tutto il profilo mentre il calcare è sempre presente.

Chiave di riconoscimento dei suoli

Colori prevalenti 10YR (Munsell): LISCARO tipica Colori prevalenti 2,5Y o più gialli (Munsell): GRINDOLATO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

non si rileva un particolare modello di distribuzione dei suoli.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026