

Unità operativa U0897

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
20.00	CSB1	CASTEL BOGLIONE franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
25.00	BLA2	BLANGERA franco-fine, fase decarbonatata	Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
45.00	SNN1	SINNO franca-fine, fase tipica	Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità posta in Val Curone a sud dell'abitato di Pozzol Groppo (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Rilievo collinare con versanti acclivi e a dislivelli rilevanti che è interessato da numerosi fenomeni gravitativi. L'uso del suolo è esclusivamente a bosco. La litologia è caratterizzata dalle Arenarie di Ranzano che comprendono arenarie, peliti ed, in parte, conglomerati.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli della fase SINNO tipica hanno un elevato sviluppo pedogenetico con formazione di un orizzonte Bt, con evidente illuviazione di argilla, mentre i suoli BLANGERA decarbonatata hanno una debole evoluzione pedogenetica che si manifesta nel subsoil con la presenza di un orizzonte che mostra formazione di struttura ed alterazione di colore. Entrambi questi suoli a seguito dei processi di decarbonatazione non manifestano generalmente reazione all'acido cloridrico. Infine si trovano, in particolare nelle aree interessate da fenomeni gravitativi e dove si osservano processi erosivi in atto, i suoli della fase CASTEL BOGLIONE tipica che individua suoli non pedogenizzati a causa del continuo ringiovanimento ai quali sono sottoposti ad opera dell'erosione.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. presenza di evidente reazione all'acido cloridrico lungo tutto il profilo: CASTEL BOGLIONE tipica 1. assenza di reazione all'acido cloridrico o bassa reazione lungo il profilo: vai a 2 2. presenza di fenomeni di illuviazione di argilla con formazione di un orizzonte di illuviazione (Bt): SINNO tipica 2. assenza di fenomeni di illuviazione di argilla e evidenza di un orizzonte di alterazione di colore (Bw): BLANGERA decarbonatata

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026