

Unità operativa U0906

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
25.00	TRV2	TRIVERSA franco-grossolana, fase carbonatica	Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
35.00	PVC1	PRANDI VAL CHERASCA franco-grossolana su scheletrico-franca, fase tipica	Typic Ustifluvent, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		
30.00	BDA1	BORMIDA franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustifluvent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Colli Tortonesi lungo il corso dei torrenti Curone, Grue e Staffora .

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta dei fondivalle alluvionali del torrente Curone e Grue, in parte ancora interessati dalle piene ordinarie e straordinarie dei corsi d'acqua. I depositi sono costituiti da sabbie e limi di origine alluvionale. L'uso del suolo è costituito prevalentemente da seminativi (mais e grano) avvicendati con prati ed erbai.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli TRIVERSA carbonatica sono suoli debolmente evoluti che mostrano la formazione di un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw), hanno sempre tessiture con percentuali di argilla inferiori al 18% e sono calcarei; essi inoltre mostrano un andamento del contenuto di carbonio organico lungo il profilo che testimonia le successive deposizioni di sedimenti operate dai corsi d'acqua. I suoli BORMIDA e PRANDI VAL CHERASCA sono, invece, suoli non evoluti e calcarei che hanno tessiture con argilla sempre inferiore al 18%; i PRANDI VAL CHERASCA si differenziano perché mostrano abbondante scheletro arrotondato all'interno del profilo.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un orizzonte di alterazione di colore e/o formazione di struttura: TRIVERSA carbonatica 1. assenza di un orizzonte di alterazione di colore e/o formazione di struttura: vai a 2 2. presenza di scheletro: PRANDI VAL CHERASCA tipica 2. assenza di scheletro: BORMIDA tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

I TRIVERSA carbonatica si trovano nelle porzioni più distali rispetto ai corsi d'acqua.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026