

Unità operativa U0928

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
10.00	RIV1	RIVODORA franco-fine, fase tipica	Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
15.00	CAN1	CASTELLO D'ANNONE franco-fine, fase tipica	Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
30.00	CSB1	CASTEL BOGLIONE franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
45.00	BLA1	BLANGERA franco-fine, fase tipica	Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità composta da due delineazioni situate tra Visone e Grognardo e tra Obregno e Prasco (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti a franapoggio mediamente acclivi interrotti da numerose e profonde incisioni operate dall'erosione delle acque di drenaggio. Substrato costituito da marne con qualche intercalazione arenacea. Seminativi avvicendati, qualche vigneto e bosco di invasione nelle incisioni e sulle pendenze maggiori.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli BLANGERA tipica sono Inceptisuoli franchi, calcarei, ben drenati e profondi, mentre i suoli CASTELLO D'ANNONE tipici sono Alfisuoli che hanno subito processi di decarbonatazione, profondi, a tessitura generalmente più argillosa dei BLANGERA e per questo motivo a drenaggio talora mediocre; infine i suoli CASTELBOGLIONE tipici sono Entisuoli carbonatici franco-sabbiosi a profondità variabile in funzione dell'erosione e degli scassi dei vigneti. Sporadicamente, nelle posizioni più stabili, si trovano anche i suoli RIVODORA tipici che sono inceptisuoli che hanno subito decarbonatazione.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Assenza di un orizzonte di alterazione (Bw): CASTELBOGLIONE tipica 1. presenza di un orizzonte di alterazione (Bw): vai a 2 2. presenza di un orizzonte di accumulo di argilla con pellicole (Bt): CASTELLO D'ANNONE tipica 2. assenza di un orizzonte di argilla illuviale e presenza di orizzonte cambico: vai a 3 3. presenza di reazione all'acido cloridrico lungo tutto il profilo: BLANGERA tipica 3. assenza di reazione all'acido cloridrico lungo tutto il profilo: RIVODORA tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente. Solo i suoli RIVODORA tipica appaiono localizzati nelle posizioni più stabili.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026